

医療区分1では不適切と思われる患者の状況

～ 医療区分の適正な実施に関する状況調査より～

調査時期:平成23年4月

対象病床:日本慢性期医療協会 医療保険療養病床(回復期リハは除く)

回答病棟:325病棟(176病院)

下記の患者の状況は、日本慢性期医療協会が作成した「医療区分1の分類」(試案)に基づく。

(複数回答)

区分	医療提供状況	回答病棟数 n=325	比率(%)
1-5	癌ターミナル(余命1ヶ月以内)	131	40.3
1-5	喘息重積発作	111	34.2
1-5	認知症老人の日常生活自立度(M)	99	30.5
1-5	肝不全(腹水高度, NH4Cl 120mg/dl以上)	98	30.2
1-5	心不全(高度非代償性)	97	29.8
1-5	重度意識障害(JCS100以上)	95	29.2
1-4	癌ターミナル(余命2～3ヶ月)	90	27.7
1-4	認知症老人の日常生活自立度()	89	27.4
1-5	喀痰吸引(7回/日以下)	84	25.8
1-5	その他の感染症(CRP 5以上、顆粒球減少症、ウイルス性など)	74	22.8
1-5	BNP(1,000以上)	74	22.8

* 医療区分1では不適切だと考える患者の状況

(複数回答)

区分	医療提供状況	回答病棟数 n=325	比率 (%)
1-5	妄想、幻覚	73	22.5
1-5	Hb(7 g/dl以下)	73	22.5
1-5	低栄養 (Alb 2.5 g/dl以下)	72	22.2
1-5	脱水 (BUN 50 mg/dl以上)	70	21.5
1-5	自殺企図	67	20.6
1-5	胸水、心嚢液貯留	65	20.0
1-5	仮性球麻痺 (経管栄養)	64	19.7
1-5	徐脈 (40 以下) RonT、af. (f波500/min以上)	62	19.1
1-5	CKD (クレアチニン6mg/dl以上)	61	18.8
1-4	重度意識障害 (JCS30以上)	59	18.2
1-3	癌ターミナル (余命4~6ヶ月)	58	17.8
1-5	血糖 (随時血糖 200 mg/dl以上、HbA1c8以上)	51	15.7
1-5	錐体外路症状 (重度)	49	15.1
1-5	SAB、AVB (度) SSS	49	15.1
1-4	肝不全 (腹水軽度、NH4Cl 100mg/dl以上)	49	15.1
1-5	難治高血圧 (治療にもかかわらず日中最高血圧180mmHg以上)	45	13.8
1-5	全麻手術後1ヶ月以内	41	12.6
1-4	CKD (クレアチニン4mg/dl以上)	40	12.3
1-4	BNP (500以上)	37	11.4

* 医療区分1では不適切だと考える患者の状況

(複数回答)

区分	医療提供状況	回答病棟数 n=325	比率(%)
1-4	脱水(BUN40mg/dl以上)	36	11.1
1-3	認知症老人の日常生活自立度()	31	9.5
1-4	Hb(8g/dl以下)	28	8.6
1-4	低栄養(Alb3g/dl以下)	27	8.3
1-4	血糖(随時血糖150mg/dl以上、HbA1c7以上)	26	8.0
1-3	脱水(BUN 30 mg/dl以上)	22	6.8
1-3	意識障害(JCS 20、10)	21	6.5
1-3	低栄養(Alb 3.5 g/dl以下)	13	4.0
1-3	Hb(9 g/dl以下)	13	4.0
1-3	BNP(100以上)	11	3.4

医療療養病床は、患者の状態像によって医療区分1～3に分類される。最も状態が「軽い」と判断されている医療区分1を分類する試案を日本慢性期医療協会が作成。

医療区分1の分類

【医療区分1 - 5】

- ・重度意識障害(JCS100以上)
- ・癌ターミナル(余命1ヶ月)以上
- ・肝不全(腹水高度, NH₄Cl120mg/dl)
- ・CKD(クレアチニン6mg/dl以上)
- ・喘息重積発作
- ・仮性球麻痺(経管栄養)
- ・喀痰吸引(7回/日以下)
- ・全麻手術後1ヶ月以内
- ・その他の感染症(CRP5以上, 顆粒球減少, ウイルス性など)
- ・胸水, 心嚢液貯留
- ・妄想, 幻覚
- ・錐体外路症状(重度)
- ・認知度(M)
- ・自殺企図
- ・難治高血圧
(治療にもかかわらず日中最高血圧180mmHg以上を呈する例)
- ・心不全(高度非代償性)
- ・SAB, AVB(度)SSS
- ・徐脈(40以下)RonT, af.(f波500/min以上)
- ・脱水(BUN50mg/dl以上)
- ・低栄養(Alb2.5g/dl以下)
- ・Hb7g/dl以下
- ・BNP(1000以上)
- ・血糖(随時血糖200mg/dl以上, HbA1c8以上)

【医療区分1 - 4】

- ・重度意識障害(JCS30以上)
- ・肝不全(腹水高度, NH₄Cl100mg/dl以上)
- ・CKD(クレアチニン4mg/dl以上)
- ・認知度()
- ・脱水(BUN40mg/dl以上)
- ・低栄養(Alb3g/dl以下)
- ・Hb8g/dl以下
- ・BNP(500以上)
- ・血糖(随時血糖150mg/dl以上, HbA1c7以上)

【医療区分1 - 3】

- ・意識障害(JCS20, 10)
- ・癌ターミナル(余命6ヶ月)
- ・認知度()
- ・脱水(BUN30mg/dl以上)
- ・低栄養(Alb3.5g/dl以下)
- ・Hb9g/dl以下
- ・BNP(100以上)

【医療区分1 - 2】

- ・区分1 - 3, 1 - 4, 1 - 5, 以外でADL区分3の人

【医療区分1 - 1】

- ・区分1 - 3, 1 - 4, 1 - 5以外でADL区分1, 2の人

最も状態が「軽い」とされている医療区分1には、施設での対応が可能な軽症から重度意識障害、癌ターミナル、肝不全などの重症まで、実に多種多様な病態が含まれている。